

On dispose de 2 microphones avec un enregistreur capable de calculer les durées entre deux sons. Nous avons aussi une règle et une calculatrice.

1. Rappeler la relation permettant de calculer la vitesse connaissant le temps et la distance (en précisant les unités).
2. Proposer un protocole pour mesurer la vitesse du son avec le matériel disponible.

□ **Faire valider par le professeur**

3. Schématiser le dispositif et expliquer en quelques phrases comment vous allez procéder.




4. Mesurer la distance séparant les deux micros.
5. Calculer la durée mise par le son pour aller d'un microphone à l'autre.
6. Calculer la vitesse avec laquelle se propage le son.

On dispose de 2 microphones avec un enregistreur capable de calculer les durées entre deux sons. Nous avons aussi une règle et une calculatrice.

1. Rappeler la relation permettant de calculer la vitesse connaissant le temps et la distance (en précisant les unités).
2. Proposer un protocole pour mesurer la vitesse du son avec le matériel disponible.


□ **Faire valider par le professeur**

3. Schématiser le dispositif et expliquer en quelques phrases comment vous allez procéder.




4. Mesurer la distance séparant les deux micros.
5. Calculer la durée mise par le son pour aller d'un microphone à l'autre.
6. Calculer la vitesse avec laquelle se propage le son.


Fréquence d'un son



Fréquence d'un son



Fréquence d'un son



3

Activité documentaire

Quels sont les dangers des sons trop forts ?



Selon une enquête récente, plus des trois quarts des 15-30 ans ont déjà ressenti des troubles auditifs. La durée et le volume sonore de l'écoute peuvent avoir un impact sur l'audition. Les casques et écouteurs sont aujourd'hui limités à 100 dB.

► **Que signifie cette indication ?**

doc.1 Mesure du volume sonore


En physique, on mesure le volume sonore par une grandeur appelée « niveau d'intensité sonore » mesuré en décibel (dB). On le mesure à l'aide d'un sonomètre sur une échelle de 0 à 200 dB.



doc.2 Les médecins conseillent de régler le volume des écouteurs à la moitié du volume maximum

⚠ Dans l'oreille interne, se trouvent environ 20 000 cellules ciliées qui transforment le signal auditif en signal nerveux. Un son trop intense peut endommager les cellules ciliées (et provoquer des acouphènes) ou détruire ces cellules qui ne se renouvellent pas. La perte d'audition est alors irréversible.

Vidéo



doc.3 Échelle des niveaux d'intensité sonore en dB

► J'extrais des informations

1. En quelle unité mesure-t-on le niveau d'intensité sonore ?
2. Quel est, en dB, le seuil d'audibilité ? le seuil de la douleur ?

► J'exploite des documents scientifiques

3. Est-ce sans danger pour l'audition d'assister à un concert de rock ?
4. À quel niveau d'intensité sonore est-il conseillé de régler ses écouteurs ?
5. Dans une cantine scolaire, on peut mesurer jusqu'à 100 dB. Pourquoi déjeuner à la cantine rajoute-t-il de la fatigue à la journée de classe ?

► Je produis un document scientifique

6. Créer une diapositive pour un diaporama expliquant les dangers d'un son trop intense. Utiliser les mots suivants :
 - niveau
 - intensité sonore
 - décibel

Info

Pour en savoir plus :

- www.journee-audition.org
- www.ecoute-ton-oreille.com